

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ พิชิตเป้าหมายลดการติดเชื้อ (CAUTI) ด้วยกระบวนการ KM

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลลำปาง: สู่เป้าหมาย CAUTI เป็นศูนย์

ปัญหาและเป้าหมาย (The Challenge)



วิกฤต CAUTI
มีแนวโน้มสูงขึ้น



เป้าหมายสำคัญ:
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อ
1,000 วันคาสายสวน &
ปฏิบัติตามแนวทาง >80%



แนวทางปฏิบัติสำคัญ (Key Practices)

✓ สิ่งที่ควรปฏิบัติ	✗ สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
การใส่สายสวน: ใส่เมื่อจำเป็นเท่านั้น ตรวจสอบข้อบ่งชี้, ใช้เทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic Technique)	ไม่สวมล้างกระเพาะปัสสาวะโดยไม่มีข้อบ่งชี้
การดูแล: ระบบปิดและตำแหน่งที่ถูกต้อง ดูแลเป็นระบบปิด, ทุงปัสสาวะต่ำกว่ากระเพาะปัสสาวะ, ไขว้างบบพัน	ไม่ใส่ยาต้านจุลชีพในทุงปัสสาวะ
การถอดสายสวน: ประเมินทุกวัน ประเมินความจำเป็น, ถมออกทันทีที่หมดความจำเป็น (Prompt Removal)	ไม่ส่งปัสสาวะเพาะเชื้อเป็นประจำโดยไม่จำเป็น

ผลลัพธ์ความสำเร็จ (Proven Results)



บรรลุเป้าหมายในเดือนธันวาคม 2567:
ลดลงจนเหลือ 0

ต.ค. 67:	ติดเชื้อ 1 ครั้ง	568 วันคา
พ.ย. 67:	ติดเชื้อ 2 ครั้ง	602 วันคา
ธ.ค. 67:	ติดเชื้อ 0 ครั้ง	586 วันคา